

گیاه بابونه آلمانی با نام علمی «*Matricaria recutita*» یا «*Matricaria chamomilla*» و نام عمومی کامومیل «*German chamomile*» در طب سنتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و از گذشته های دور مصارف درمانی متعددی داشته است. امروزه منابع معتبر دنیا، بسیاری از مصارف سنتی بابونه را مورد تأیید قرار داده اند. شرکت داروسازی گیاهی «نو تک فار» با استناد به مدارک موجود در منابع علمی، اقدام به فرمولاسیون و تولید ژل «رکوبیزول» با استفاده از مواد مؤثره ی گل های گیاه بابونه آلمانی نموده است. علاوه بر آن از مواد مؤثره ی گل همیشه بهار با نام علمی «*Calendula officinalis*» و نام عمومی «*Calendula*» جهت ایجاد عطر و بوی مطبوع و تقویت اثرات ضد التهابی این دارو استفاده شده است.

موارد مصرف:

در سر، صورت و بدن شامل:

- انواع التهابات پوستی نظیر آکنه، اگزما، کهیر، دمل و کورک، عرق سوز، ادرار سوختگی - سوختگی ها و زخم های سطحی

- صدمات پوستی نظیر ترک پوستی و پستان، کبودی، سرما زدگی، نیش حشرات و هموروئید

مقدار و نحوه مصرف:

روزی ۳-۴ بار، هر بار یک لایه نازک از ژل روی موضع مورد نظر مالیده شود (تا از بین رفتن علائم بیماری، درمان را ادامه دهید).

- در برخی موارد قرار گرفتن ژل روی موضع ممکن است موجب سوزش ملایمی گردد که طبیعی است و پس از چند ثانیه رفع می گردد.

عوارض جانبی:

برای مصارف پوستی این دو گیاه عارضه ای گزارش نشده است. افرادی که سابقه قبلی حساسیت به ترکیبات بابونه و گل همیشه بهار دارند از مصرف این دارو خودداری نمایند. در صورت مشاهده هرگونه حساسیت احتمالی از ادامه مصرف دارو خودداری نمائید.

تداخلات دارویی:

در مصرف فرآورده های حاوی بابونه تداخلی گزارش نشده است.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی مجاز می باشد.

شرایط نگهداری:

دمای مناسب نگهداری ۲۵-۴ درجه سانتی گراد می باشد. از یخ زدگی و درجه حرارت بالا و پائین محافظت نمائید. بعد از هر بار استفاده درب آن را محکم ببندید.

بسته بندی:

دارو به وزن خالص ۳۰ گرم در هر تیوپ، داخل جعبه به همراه برگه راهنما عرضه می گردد.

نکات قابل توجه:

- این دارو فقط جهت مصارف پوستی است (از مصرف خوراکی، چشمی، اطراف چشم و واژینال آن خودداری شود). جهت مصرف برای رفع التهاب هموروئید و خارش و التهابات نواحی تناسلی به صورت موضعی قابل استفاده می باشد.

- جهت مصارف ادرار سوختگی اطفال و التهاب پوستی در موضعی مانند کشاله ران، زیر بغل و کلاً نواحی عرق سوز شده، به منظور رسیدن به نتیجه مطلوب، ابتدا موضع مورد نظر را شسته و خشک نمائید، سپس از ژل استفاده کنید.

- مصرف این دارو در نوزادان با سن کمتر از یک ماه توصیه نمی شود.

- چنانچه پس از مصرف مداوم این دارو تا دو هفته، علائم بیماری همچنان ادامه داشت، جهت ادامه درمان با پزشک خود مشورت نمائید.

- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.